

ಮಲಿಹುಳು:

ಮಲಿಹುಳುಗಳು ಕಾಂಡದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಂಡು ಮೃದು ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ನಾಲಿನಂತಹ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೊರ ಸೂಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ಮಲಿಹುಳುಗಳು ಸುಮಾರು 5 ಸೆಂ. ಮೀ. ನಷ್ಟು ಉದ್ದದವರೆಗೆ ಬೆಳೆದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಶಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರಲು 35 ದಿನಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ 129 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲಿ ಹುಳುಗಳು ಕೆಂಪುದುಂಬಯ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೀಟದ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಕಾಂಡದ ರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಹೊರ ಸೂಸುವ ನಾಲಿನಂತಹ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕಾಂಡದ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಆಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಕೀಟದ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದು.


ಕೋಶಾವಸ್ಥೆ:

ನಾಲಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕೋಶದೊಳಗೆ ಮಲಿಹುಳುಗಳು ಕೋಶವಸ್ಥೆ ಕಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರ ಗಾತ್ರವು 0.35 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ 0.12 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಗಲದ ಸಿಲಿಂಡ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕೋಶಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢ ದುಂಬಯಾಗಲು 3 ರಿಂದ 4 ವಾರಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೌಢ ದುಂಬ:

ಪ್ರೌಢ ದುಂಬಗಳು ಕೆಂಪು-ಕಂದು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ನೋಡಲು ಸಿಲಿಂಡ್ರಾಕಾರವಿದ್ದು ಉದ್ದವಾದ ಬಾಲದ ಮೂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಪ್ರೌಢ ದುಂಬಗಳನ್ನು ಮೂಲನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೃದುವಾದ ಕೂದಲುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಗಂಡು ದುಂಬಗಳು ಮೂಲನ ಮೇಲೆ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಹೆಣ್ಣು ದುಂಬಗಳು ಈ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರೌಢ ದುಂಬಗಳು ಎಲೆಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಿತು ಕೂರುವುದರಿಂದ ಈ ಕೀಟದ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅತಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.



ಗಂಡು ಕೆಂಪುದುಂಬ

ಹೆಣ್ಣು ಕೆಂಪುದುಂಬ

ಕೀಟ ಬಾಧೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು

- ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಮರಗಳು ಅಂದರೆ 5-20 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮರಗಳು ಹಾಗೂ ಲಿಡ್ಡ ತಳಿಯ ಮರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ
- ಈ ಕೀಟವು ಕಾಂಡದ ಮೃದು ಅಂಗಾಂಶ, ಸುಳಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಗಲಿಗಳ ಹತ್ತಿರದ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಸುರಂಗಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ತಿಂದು ನಾಲಿನಂತಹ

ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ರಂಧ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ. ಕೀಟ ಬಾಧೆಯು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಬಾಧಿತ ರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಕೆಂಪು-ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಮಿಶ್ರಿತ ದ್ರವವೂ ಸೋರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

- ಮಲಿಹುಳುಗಳು ಕಾಂಡದ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸುಳಿ ಭಾಗದ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಕಾಂಡದ ಒಳ ಭಾಗವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊಳೆತಿರುವ ನಾರುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕ್ರಮೇಣ ಸುಳಿ ಭಾಗದ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿ, ಸುಳಿಯು ಸೊರಗಿ ಅದರ ಬುಡ ಭಾಗ ಉದ್ದವಾಗಿ ಸೀಳಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿರ ಭಾಗ ಉರುಳಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ.
- ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರವು ಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಬದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೀಟದ ಬಾಧೆಯಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.

ಕೀಟ ಬಾಧೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು

- ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೃಷಿ/ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಈ ದುಂಬಯ ತೀವ್ರತೆ, ಹಾವಳಿ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
- ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5 ರಿಂದ 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೀಟ ಬಾಧೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
- ಸುಳಿ ಕೊಳೆಯುವ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ರೈನೋಸೆರೆಸ್ ದುಂಬ ಬಾಧಿತ ಮರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಈ ಕೀಟದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೀಟ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಮಗ್ರ ಪೀಡೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕೀಟದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು

- ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಸುಳಿ ಹಾಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಬೇಕು.
- ಸಸಿಗಳನ್ನು ಶಿಫಾಲಿಸಿದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು.
- ಕೀಟ ಬಾಧಿತ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವಾಗ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ತಗುಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು (ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು).
- ಲಿಡ್ಡ ತಳಿಯ ಮರಗಳು ಈ ಕೀಟ ಬಾಧೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುತ್ತಾಗುವುದರಿಂದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
- ಎಲೆಯ ಅಕ್ಷಗಳು ಕೆಂಪು ದುಂಬಯು ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಲಿ (10%) + ಮರಗಳನ್ನು ಸರಾಸರಿ 1:1 ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.
- ಹೊರ ಭಾಗದ ಹಸಿರು ಗಲಿಗಳು ಅಥವಾ ಸೋಗೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಂಡದಿಂದ ಸುಮಾರು 1 ಮೀ. ನಷ್ಟು ದೂರ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೀಟನಾಶಕದಿಂದ ಉಪಚರಿಸಬೇಕು.